

表1 四川荞麦属野生种质资源、生境及分布

中名 Chinese name	学名 Species	生境 Habitat	分布 Distribution
金荞麦	<i>F.cymosum</i>	生于海拔280~2400m的山坡、河谷、草丛、路旁、田埂、土石坎、乱石堆、坟堆、房前屋后、溪沟边等。	攀枝花市;凉山州普格、盐源、冕宁、越西、甘洛、雷波、美姑等;阿坝州岷江河谷上游。四川全境。
大野荞麦	<i>F.megaspartanium</i>	山坡、草丛、路旁、田埂、沟坎、乱石堆、河坝、河谷、坟堆。	凉山州冕宁、布拖、德昌。
抽葶野荞麦	<i>F.statica</i>	生于海拔900~1500m的山地、草丛、路旁、岩石上、碎石堆。	凉山州雷波。
硬翅野荞麦	<i>F.urophyllum</i>	生于海拔500~2600m的山坡、沟谷、草丛、乱石堆、坟堆、沟坎、路旁。	攀枝花市区及米易、盐边;凉山州宁南、会东、会理、普格、喜德、昭觉、金阳、雷波、盐源、木里;阿坝州松潘、九寨沟。
细柄野荞麦	<i>F.gracilipes</i>	生于海拔450~3800m的山坡、荒山、林地、灌丛、草丛、旷野、乱石堆、坟堆、沟坎、路旁、菜地、土坎上、果园、土墙上,荞麦地、玉米地、马铃薯地、萝卜地、花生地、红薯地、圆根地、苜蓿地、青稞地、房前屋后、田边地角、岩石上、石缝中、沟边。	攀枝花市区及米易、盐边;凉山州宁南、会东、会理、德昌、西昌、普格、盐源、喜德、美姑、雷波、冕宁、昭觉、越西、甘洛;乐山马边、峨边;泸州叙永、古蔺;宜宾筠连;雅安荣经、芦山、石棉、天全;阿坝州汶川、小金、金川、黑水、理县、茂县、丹巴、松潘、九寨沟、马尔康;甘孜州康定、泸定县。成都彭州、崇州。
齿翅野荞麦 (变种)	<i>F.gracilipes var. odontopterum</i>	该变种与原变种细柄野荞麦混生,具有相似的海拔高度、生态环境和相同的分布地点。	
小野荞麦	<i>F.leptopodum</i>	生于海拔500~3000m的山坡、沟谷、乱石山坡、荒山、荒地、灌木丛、沙堆、路边、碎石堆、农田、草丛中。	攀枝花市区及盐边;凉山州宁南、会东、会理、普格、盐源、冕宁、木里、甘洛、金阳、雷波等县通常沿金沙江、雅砻江干热河谷分布;阿坝州的汶川县、茂县;雅安石棉、汉源。
疏穗小野荞 (变种)	<i>F.leptopodum var. grossii</i>	该变种与原变种小野荞麦混生,具有相似的海拔高度、生态环境和分布地点。通常在1000m以下的低海拔地区分布较多。	
线叶野荞麦	<i>F.lineare</i>	生于海拔900~1400m的山坡、碎石山地、荒坡、山涧、沙堆、岩石上。	攀枝花及凉山州宁南、会东、会理、雷波、金阳等县市。
岩野荞麦	<i>F.gilesii</i>	生于海拔800~1200m的石灰岩石上、碎石堆上、沙粒堆上、杂草丛中。	凉山州雷波、汶水。
尾叶野荞麦	<i>F.caudatum</i>	生于海拔800~3200m的山坡、灌木丛、林地、岩石上、果园、房前屋后、菜地、玉米地、公路旁、草丛、溪流旁、土坎上、乱石堆中。	凉山州冕宁县;阿坝州汶川、茂县、马尔康、金川、丹巴县、理县、小金县、黑水县、松潘、九寨沟。
皱叶野荞麦	<i>F.crispatifolium</i>	生于海拔1900m左右的田埂上、杂草丛中。	凉山州普格县螺髻山镇。
密毛野荞麦	<i>F.densovillosum</i>	生于海拔1300~3100m的山坡、林地、草地、山岩上、路旁、田间、荒地、地边、房前屋后、果园、玉米地、马铃薯地、甘薯地、花生地、蔬菜地、萝卜地、圆根地、烤烟地、苦荞地。	凉山州普格、盐源、布拖、昭觉、美姑、冕宁;甘孜州泸定、康定。
花叶野荞麦	<i>F.polychromofolium</i>	生于海拔1210~1240m的山坡、草丛、土坎、路旁、沟边、田边地角。	阿坝州汶川县杂谷脑河谷。
*川滇野荞麦	<i>F.homotropicum</i>	生于山坡、沟谷贫瘠土壤或岩石上。	阿坝州岷江河谷上游。
*阿坝野荞麦	<i>F.leioramosum</i>	生于农田周边、路边。	阿坝州岷江河谷上游茂县、汶川广布。
*丽花野荞麦	<i>F.callianthum</i>	生于山坡上、农田及其周围。	阿坝州岷江河谷上游汶川、理县,常见杂谷脑河谷。
*岷江野荞麦	<i>F.pleioramosum</i>	生于路边或农田边。	阿坝州仅分布于岷江河谷上游茂县、汶川。
金沙野荞麦	<i>F.jinshaense</i>	生于干热河谷。	沿金沙江河谷多有分布。
苦荞野生近缘种(亚种)	<i>F.tataricum ssp.potanini</i>	生于海拔800~3800m的山坡、林地、灌木丛、草地、草场、荒地、空闲地、果园、玉米地、马铃薯地、荞麦地、青稞地、菜地、田边地角、房前屋后。	阿坝州汶川、小金、理县、茂县、金川、黑水、九寨沟、红原、松潘、马尔康、若尔盖;甘孜州康定。
甜荞野生近缘种(亚种)	<i>F.esculnetum ssp.ancestralis</i>	生于海拔800~3631m的山坡、林地、灌木丛、草地、荒地、草丛、荒山、荒坡、山岩上、乱石堆、田地、玉米地、荞麦地、青稞地、菜地、果园、田边地角、房前屋后。	凉山州盐源、冕宁、雷波、金阳;阿坝州汶川、小金、黑水、理县、茂县、九寨沟、红原、松潘、马尔康;甘孜州雅江、泸定。

注:表中“\*”为新拟中文名。